

What Should I Know about Rivaroxaban?

- ❖ Rivaroxaban thins the blood, which prevents you from getting dangerous blood clots
- ❖ Rivaroxaban must be taken exactly as prescribed by your doctor. To ensure optimal protection from blood clots, **never skip a dose**
- ❖ You must not stop taking Rivaroxaban without first talking to your doctor as your risk of blood clots may increase
- ❖ Tell your healthcare provider about any other medicines you are currently taking, took

recently or intend to start taking, before you start Rivaroxaban

- ❖ Tell your healthcare provider that you are taking Rivaroxaban before any surgery or invasive procedure.

When Should I Seek Advice from my Healthcare Provider?

When taking a blood thinner such as Rivaroxaban it is important to be aware of its possible side effects. Bleeding is the most common side effect. Do not start taking Rivaroxaban if you know you are at risk of

bleeding, without first discussing this with your doctor. Tell your healthcare provider straight away if you have any signs or symptoms of bleeding such as the following:

- ❖ Pain
- ❖ Swelling or discomfort
- ❖ Headache, dizziness or weakness
- ❖ Unusual bruising, nosebleeds, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding
- ❖ Menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal
- ❖ Blood in your urine which may be pink or brown, red or black stools.

- ❖ Coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds.

How do I Take Rivaroxaban?

- ❖ To ensure optimal protection, Rivaroxaban.
 - 2.5 mg can be taken with or without food.
 - 10 mg can be taken with or without food.
 - 15 mg must be taken with food.
 - 20 mg must be taken with food.

PAC-RIVA-JO-01;
Date of preparation: October 2025

PATIENT ALERT CARD

Rivaroxaban 2.5 mg	<input type="checkbox"/>
Rivaroxaban 10 mg	<input type="checkbox"/>
Rivaroxaban 15 mg	<input type="checkbox"/>
Rivaroxaban 20 mg	<input type="checkbox"/>

- ❖ Keep this card with you at all times
- ❖ Present this card to every physician or dentist prior to treatment

MACLEODS

بطاقة تنبيه المريض

- ريفاروكسابان 2.5 ملغم
- ريفاروكسابان 10 ملغم
- ريفاروكسابان 15 ملغم
- ريفاروكسابان 20 ملغم

- ❖ احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات
- ❖ قدمها لأي طبيب أو طبيب أسنان قبل تلقي العلاج

MACLEODS

- 10 ملغم : يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه

- 15 ملغم : يجب تناوله مع الطعام

- 20 ملغم : يجب تناوله مع الطعام

PAC-RIVA-JO-01
تاريخ الإعداد : أكتوبر 2025

❖ صداع, دوار أو ضعف عام
❖ كدمات غير معتادة , نزيف من الأنف أو اللثة أو جروح يستغرق توقف نزيفها وقتاً طويلاً

❖ تدفق دم الحيض أو نزيف مهبلي أكثر غزارة من المعتاد

❖ دم في البول (قد يكون وردي أو بني اللون) أو براز أحمر أو أسود

❖ سعال مصحوب بالدم أو تقيؤ دم أو مادة تشبه نفل القهوة

كيف أتناول ريفاروكسابان ؟

❖ ضمان أفضل حماية , اتبع التعليمات التالية:

- 2.5 ملغم : يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه

❖ أخبر مقدم الرعاية الصحية أنك تتناول ريفاروكسابان قبل أي عملية جراحية أو إجراء طبي يتضمن تدخلاً جراحياً

متي يجب أن استشير مقدم الرعاية الصحية؟

عند تناول دواء مميع للدم مثل ريفاروكسابان , من المهم معرفة آثاره الجانبية و أبرزها النزيف .

لا تبدأ بتناول ريفاروكسابان إذا كنت تعلم أنك معرض لخطر النزيف دون استشارة طبيبك أو لا .

اتصل بمقدم الرعاية الصحية فوراً إذا ظهرت عليك أي علامات أو أعراض للنزيف مثل:

- ❖ ألم
- ❖ تورم أو انزعاج

ماذا يجب أن أعرف عن دواء ريفاروكسابان؟

❖ ريفاروكسابان يعمل على تسهيل الدم, مما يساعد على منع تكون جلطات دموية خطيرة

❖ يجب تناول ريفاروكسابان بالضبط كما يصفه طبيبك , لضمان الحماية المثلى من الجلطات الدموية , لا تتخط أي جرعة

❖ يمنع التوقف عن تناول ريفاروكسابان دون استشارة طبيبك بالأول , لأن ذلك قد يزيد من خطر إصابتك بالجلطات

❖ أخبر مقدم الرعاية الصحية عن أي أدوية تتناولها حالياً أو تناولتها مؤخراً أو تنوي البدء بها قبل أن تبدأ بتناول ريفاروكسابان

**I am under anticoagulation treatment
with Rivaroxaban**

Name: _____ Other medications/Conditions: _____
Address: _____

Date of birth: _____ Weight: _____

**In case of emergency,
please notify:**

Doctor's name

Doctor's phone

Doctor's stamp

Please also notify:

Name

Phone:

Relationship

**Information for
healthcare providers:**

❖ INR values should not be used
as they are not a dependable
measure of the anticoagulant
activity of Rivaroxaban.

Report any suspected adverse
reactions at:
The National
Pharmacovigilance Centre (NPC)
Phone: +962-6-5632000
E-mail: jpc@jfd.a.jo
Website: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/jo/jpc>

MACLEODS



معلومات لمقدمي الرعاية الصحية

❖ لا يجب استخدام قيمه INR (نسبة
المعيارية الدولية) لأنها ليست
مقياساً موثقاً لفعالية ريفاروكسابان
كمضاد لتخثر الدم
أبلغ عن أي آثار جانبية مشتبها بها لى:
المركز الوطني للتبقيط الدوائي (NPC)
هاتف: +962-6-5632000
بريد إلكتروني: jpc@jfd.a.jo
موقع الكتروني: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/jo/jpc>



MACLEODS

يرجى أيضا إبلاغ

الاسم:

الرقم:

صلة القرابة

في حالة الطوارئ يرجى إبلاغ

اسم الطبيب

هاتف الطبيب

ختم الطبيب

أنا أتناول علاجاً مميحاً للدم باستخدام ريفاروكسابان

الاسم

العنوان

أدوية أو حالات أخرى

تاريخ الميلاد
_____ الوزن
