

Patiënteninformatiekaart



Rivaroxaban Macleods 2,5 mg ☐

Rivaroxaban Macleods 10 mg ☐

Rivaroxaban Macleods 15 mg ☐

Rivaroxaban Macleods 20 mg ☐

Rivaroxaban Macleods 15 mg + 20 mg ☐

- ♦ Draag dit kaartje altijd bij u.
- ♦ Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts voordat een behandeling plaatsvindt.

Ik word behandeld met het antistollingsmiddel Rivaroxaban Macleods (rivaroxaban).

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Gewicht:

Andere geneesmiddelen / aandoeningen:

Waarschuw bij noodgevallen:

Naam arts:

Telefoon arts:

Stempel arts:

Waarschuw ook:

Naam:

Telefoon:

Relatie:

Informatie voor zorgverleners:

- ♦ INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze geen betrouwbare maat zijn voor de antistollingsactiviteit van Rivaroxaban Macleods.

Wat moet ik weten over Rivaroxaban Macleods?

- ♦ Rivaroxaban Macleods verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- ♦ Rivaroxaban Macleods moet precies worden ingenomen zoals voorgeschreven door uw arts. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels mag u geen enkele dosis overslaan.
- ♦ Stop niet met het innemen van Rivaroxaban Macleods zonder eerst met uw arts te overleggen omdat u anders een groter risico loopt op het krijgen van bloedstolsels.
- ♦ Vertel het uw zorgverlener als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent te gaan doen, voordat u met Rivaroxaban Macleods begint.
- ♦ Vertel uw zorgverlener dat u Rivaroxaban Macleods gebruikt voordat u een operatie of een procedure ondergaat waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?

Bij inname van een bloedverdunner, zoals Rivaroxaban Macleods, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen ervan. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking. Als u weet dat u een risico op bloedingen hebt, start dan niet met de inname van Rivaroxaban Macleods zonder dit eerst met uw arts te hebben besproken. Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of symptomen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- ♦ pijn
- ♦ zwelling of ongemak
- ♦ hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ♦ ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneus, bloeding van tandvlees, snijwondjes die lang blijven bloeden
- ♦ menstruatie of vaginale bloeding die heviger is dan gewoonlijk
- ♦ bloed in uw urine waardoor die roze of bruin kan zijn, rode of zwarte stoelgang
- ♦ bloed ophoesten, of braken van bloed of materiaal dat de kleur heeft van koffiedik.

Hoe moet ik Rivaroxaban Macleods innemen?

- ♦ Voor een optimale bescherming moet Rivaroxaban Macleods als volgt worden ingenomen:
 - 2,5 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
 - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen